Stimulateur de croissance racinaire

xeox

Homologué par le Ministère de l'Agriculture
AMM N°1080002

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Utilisable en agriculture biologique
conformément au règlement CE 834/2007

Nourrir

ORGANIC®
Nature
ESPACES VERTS

10F14 © FRAYSSINET

Origine et action

Le stimulateur de croissance racinaire XEOX est issu de nos travaux de recherche sur les composés organiques, extraits des végétaux. Le développement d'un système racinaire précoce et performant est un facteur de réussite incontestable en pépinières ainsi que pour la mise en place et l'entretien des espaces verts. XEOX agit selon 2 types d'actions :

Action sur la protection des auxines (AIA)
En situation de stress, les plantes produisent des enzymes péroxydases responsables de la dégradation des auxines, hormones impliquées dans la rhizogénèse et la multiplication cellulaire. XEOX protège les auxines contre leurs dégradations enzymatiques : +25 % à +75 % de racines.

Action sur la résistance des systèmes racinaires
XEOX active le processus de lignification cellulaire par rigidification des tissus racinaires : effet résistance par épaississement des parois végétales.

Traitement

- Augmentation du volume et poids des racines
- Meilleure gestion des besoins hydriques et minéraux
- Résistance des plantes en situation de stress

Composition

XEOX renferme 40% de matière active (Osyr) et 50% de matière sèche.

Conseils d'utilisation

XEOX est apporté en dilution dans l'eau, dans un minimum de 300 l/ha en pulvérisation suivi d'un arrosage superficiel, ou en goutte-à-goutte et en arrosage à la concentration de 0,2 %. Produit compatible physiquement avec la plupart des produits de traitement, consulter votre technicien pour plus de précisions.

Conditionnement

Bidons de 5 litres (carton de 4 x 5 litres).



Préconisations

Gazons	Après placage ou après levée : 2 à 3 applications à 8-10 jours d'intervalle. En entretien, et périodes de stress (climatiques, piétinement, aération, salinité, phyto,...) : 2 à 3 applications à 8-10 jours d'intervalle. Doses d'application : 1 à 2 l/1000 m²
Fleurs	Après repiquage ou après levée : 2 à 3 applications à 8-10 jours d'intervalle. En entretien, relance en situation de stress : 2 à 3 applications à 8-10 jours d'intervalle. Doses d'application : en arrosage à 0,2 % ou en pulvérisation à 1-2 l/1000 m²
Arbres arbustes fruitiers ornementaux	En pépinières : 2 à 4 applications à 8-10 jours d'intervalle au printemps et en début d'automne, avant commercialisation. Après plantation et en entretien, en situation de stress : 2 à 4 applications à 8-10 jours d'intervalle. Doses d'application : en arrosage à 0,2 % ou en plantation (2 l/1000 m²) et entretien (1 à 2 l/1000 m²)

AFAQ ISO 9001

FRAYSSINET 81240 ROUAIROUX / FRANCE / TEL. +33 (0)5 63 98 42 08 / FAX +33 (0)5 63 98 47 23 / www.groupe-frayssinet.fr